

Once you get home...



If your child is fussy or has a slight fever, give him/her plenty of fluids to drink. Don't worry if your child loses his/her appetite.

If swelling and redness occur at the injection site, a cool, wet cloth may be applied over the affected area. Be sure to use a fresh clean cloth. A cool bath may be given to help reduce fever.

For pain and fever, you may give the medicine ACETAMINOPHEN. Examples of ACETAMINOPHEN are Tylenol, Panadol, Tempra and Liquiprin in the form of drops, syrup (elixir) or chewable tablets.
Do not use aspirin.

Ask your doctor about the correct dose of acetaminophen. The first dose may be given as soon as you get home. Another dose may be given in 4-6 hours. If pain and fever continue, repeat every 4-6 hours while your child is awake. Call your doctor if pain and fever do not go away in 24 hours.

Al llegar a casa...



Si su hijo(a) se pone de mal humor o tiene un poco de fiebre, dele mucho líquido para beber. No se preocupe si pierde su apetito.

Si se le hincha o se le pone rojo el lugar de la inyección, puede ponerle un paño mojado con agua fría en la parte afectada (siempre use un paño limpio). Para ayudar a bajar la fiebre, le puede dar un baño de agua fresca.

Para el dolor y la fiebre le puede dar el medicamento ACETAMINOFENO. Algunos ejemplos de ACETAMINOFENO son Tylenol, Panadol, Tempra y Liquiprin en forma de gotas, jarabe o tabletas masticables.
No use aspirina.

Pregúntele a su doctor sobre la dosis de acetaminofeno que debe ser aplicada. Le puede dar la primera dosis apenas llegue a su casa y otra dosis más a las 4 ó 6 horas. Si el dolor y la fiebre continúa, repita la dosis cada 4 a 6 horas mientras que el niño(a) esté despierto. Si el dolor y la fiebre no se le quitan en 24 horas, llame a su médico.